

胃がん サイラムザ+ nab-PTX療法 - ①

★投与スケジュール

Day1、15

① 吐き気止め
グラニセロン点滴静注バック3mg+ デカドロン注射液13.2mg
レスタミンコーワ錠10mg 5錠 内服(サイラムザ投与30分前までに服用)

30分



フィルター付きラインを使用

② 生食50mL

15分



③ サイラムザ点滴静注液 8mg/kg + 生食250mL

60分



フィルター付きラインを使用

④ 生食100mL

初回60分
問題無ければ、2回目以降は15分でも可



⑤ 抗がん剤
アブラキサン点滴静注125mg/m²+生食
※1V20mlで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴ボトルに戻す

30分



フィルター付ラインは使
用しない！

⑥ 生食50mL

15分



主な副作用

③

- インフュージョンリアクション
- 高血圧
- 血栓症
(胸の痛み、息苦しさ、片方の足の急激な痛みや腫れ、等)
- 傷が治りにくい

⑤

- 末梢神経障害
- 脱毛

2週ごとに投与

胃がん サイラムザ+ nab-PTX療法 - ②

★投与スケジュール

Day8

①

吐き気止め
グラニセロン点滴静注バック3mg+ デカドロン注射液13.2mg

30分



②

生食50mL

15分



③

抗がん剤
アブラキサン点滴静注125mg/m²+生食
※1V20mlで溶解し、必要量を抜き取り、空の点滴ボトルに戻す

30分



フィルター付ラインは使
用しない！

④

生食50mL

15分



主な副作用

③

- 末梢神経障害
- 脱毛